

## **VACUNAS**

## O DOBLE ADULTOS BACTERIANA (DT)

- **TRIPLE VIRAL**
- **HEPATITIS A**
- **HEPATITIS B**
- **VACUNA ANTIGRIPAL**
- FIEBRE TIFOIDEA

  PARENTERAL
- **POLIOMIELITIS**
- ANTIMENINGOCÓCCICA

  TETRAVALENTE ACW135Y
- **RABIA**
- Fiebre Amarilla
- Encefalitis Japonesa
- Encefalitis transmitidapor Garrapatas

## **RECOMENDACIÓN**

Refuerzo cada 10 años.

Dos dosis. Intervalo mínimo entre dosis 4 semanas. Con antecedentes de dos dosis, no es necesario refuerzos.

Dos dosis. Intervalo entre dosis 6 meses. Con esquema completo, no se requiere revacunación.

Tres dosis de vacuna. Esquema 0-1-6 meses. Con esquema completo, no se requiere revacunación.

Dosis anual.

1 dosis. 14 días antes de ingreso a aérea de riesgo. En caso de persistir el riesgo, refuerzo a los 2 años.

Para ingresar a aéreas de riesgo aplicar vacuna IPV. Puede ser requerida por el RSI.

Dosis según edad indicada. Puede ser requerida por RSI.

Esquema pre-exposición 0-7-21 a 28 días.

Una dosis.

Indicada para ingresar a zona endémica. Aplicar 10 días antes de ingresar a zona endémica. No comercializada en Argentina.

Indicada para ingresar a zona de riesgo. No comercializada en Argentina.